ROSA RUBIGINOSA

(*aculeatissima.*)

R. *germinibus subovatis pedunculisque hispidis; foliolis subrotundis, supra subpubescentibus, subtus margineque glandulosis; caule aculeis inæqualibus confertissimis subrectis; floribus* 2 – 3 *subcorymbosis.* (N.)

R. *Rubiginosa aculeatissima.* Du P. *Gym. Rosarum*, *in* Thy. R. Candolleana, p. 13, *sp.* 2, *var.* 4. Thy. Prod. de la Mon. du genre Rosier, p. 110, groupe 20, var. δ. (1)

LE ROSIER ROUILLÉ

(*à tiges très-épineuses.*)

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau s'élève en un buisson touffu à la hauteur de quatre pieds, au plus. Ses branches sont hérissées d'un grand nombre d'aiguillons inégaux, fermes, rapprochés entre eux, la plupart presque droits. Les feuilles se composent de sept, rarement de neuf folioles, un peu visqueuses, ovales-arrondies, légèrement pubescentes en-dessus, à dentelure double et glanduleuse: elles sont portées par un pétiole pubescent, chargé de glandes, garni de quelques petits aiguillons crochus, ayant

(1) Prodrome de la Monographie des espèces et variétés du genre Rosier, divisées selon leur ordre naturel, avec la synonymie, les noms vulgaires, un tableau synoptique, et deux planches gravées en couleur. Ouvrage utile aux botanistes-cultivateurs, pour l'arrangement méthodique de ces arbrisseaux dans les grandes collections, et aux pépiniéristes pour répondre aux demandes qui leur seraient faites. Par Claude-Antoine Thory, 1 vol. in-12. Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot, chez P. Dufart.